

Hudlæge Marzena Boczan informerer

Hudklinikken Tønder

Bucky-behandling

Bucky kaldes også ”bløde røntgenstråler”, der dog kun trænger 0,5 mm ned i huden. Bucky anvendes ved psoriasis, kronisk eksem eller tilsvarende hudsygdomme og gives ofte som supplement til anden behandling. Behandlingen virker kløestillende og hæmmende på betændelsesreaktioner. Effekten af behandlingen indtræder oftest først efter endt behandlingsserie.

Hvor ofte skal der behandles

Bucky gives efter lægeordination, som regel i en serie med 3–5 behandlinger med 7 -14 dages interval. Selve behandlingen tager for hvert område, der skal behandles, fra få sekunder til et minut. Beregn 10–20 minutter pr. besøg.

Lægekonsultation

Foregår efter endt behandlingsserie efter behov. Her vurderes om behandlingen har haft den ønskede effekt og der tages stilling til fremtidig behandling.

Vær særlig opmærksom på

Behandlingen kan give en midlertidig rødme, som kan efterfølges af en længerevarende brunfarvning af det behandlede område. Bucky gives ikke ubegrænset, da der kan være risiko for udvikling af en mild form for hudkræft i det område, der er behandlet. Risikoen er dog lille, og må opvejes med den bedring af hudlidelsen, som behandlingen kan give. Der er tale om godartet hudkræft, som kan behandles tilfredsstillende og hvor risikoen for spredning til indre organer er yderst ringe.